

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

ДЕТРАЛЕКС 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой  
микронизированная очищенная флавоноидная фракция

### **Внимательно прочтите этот вкладыш до конца перед тем, как начать прием препарата.**

Данный препарат отпускается без рецепта. Тем не менее, для достижения наилучших результатов вы должны соблюдать осторожность при приеме ДЕТРАЛЕКСА.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Он может вам еще понадобиться.
- Если вам требуется дополнительная информация или совет, обратитесь к фармацевту.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту.
- Если симптомы усилились или ваше состояние не улучшилось, вы должны обратиться к врачу.
- Если побочные эффекты приобретают серьезный характер или если вы отметили побочные действия, которые не перечислены в этом вкладыше, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

### **В этом вкладыше содержится следующая информация:**

1. Что такое ДЕТРАЛЕКС и в каких случаях он применяется
2. Перед тем как начать прием ДЕТРАЛЕКСА
3. Как принимать ДЕТРАЛЕКС
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить ДЕТРАЛЕКС
6. Дополнительная информация

## **1. ЧТО ТАКОЕ ДЕТРАЛЕКС И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ**

### **Фармакотерапевтическая группа:**

Фармакотерапевтическая группа: капилляростабилизирующие препараты, биофлавоноиды

Код АТХ: С05СА53

### **Показания для применения:**

Лечение симптомов функциональной и органической хронической венозной недостаточности нижних конечностей:

- тяжесть в ногах
- боль
- ночные судороги.

Лечение функциональных симптомов, связанных с острыми приступами геморроя.

## **2. ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ПРИЕМ ДЕТРАЛЕКСА**

### **В каких случаях не следует принимать ДЕТРАЛЕКС**

Повышенная чувствительность к активному веществу или одному из вспомогательных веществ.

### **Будьте внимательны при приеме ДЕТРАЛЕКСА**

Этого препарата не достаточно для предупреждения риска флебита у госпитализированных больных или у иммобилизированных пациентов.

Венозная недостаточность может потребовать специальных мер, таких как применение компрессионных чулок .

Боль, анальное кровотечение, которые продолжаются несмотря на применение препарата, могут быть признаком другой болезни, а не геморроя. Необходима консультация с врачом.

Аналогично, пациенты старше 50 лет, которые отмечают у себя неожиданное анальное кровотечение, должны обратиться к своему лечащему врачу.

Назначение этого препарата для симптоматического лечения острого приступа геморроя не отменяет лечения других заболеваний анальной области.

Если симптомы проходят не сразу, следует провести проктологическое обследование и пересмотреть лечение.

### **Прием других препаратов**

Всегда сообщайте своему врачу или фармацевту, какие препараты вы принимаете или недавно принимали, даже если это препараты, отпускаемые без рецепта.

### **Беременность и кормление грудью**

Беременность - это период в жизни женщины, когда особенно важно не принимать медикаменты без совета врача. Поэтому поставьте своего врача в известность, если вы планируете беременность. В это время следует избегать любого вредного воздействия на организм.

Кормление грудью: ввиду отсутствия данных о проникновении препарата в материнское молоко следует избегать лечения во время кормления грудью.

### **Вождение автотранспорта и управление механизмами**

ДЕТРАЛЕКС не влияет или влияет ничтожно мало на способность к вождению автотранспорта и управление механизмами.

## **3. КАК ПРИНИМАТЬ ДЕТРАЛЕКС**

При приеме ДЕТРАЛЕКСА всегда строго соблюдайте указания врача. Если вы сомневаетесь в правильности приема препарата, вы должны посоветоваться с врачом или фармацевтом.

## **Дозировка**

*При лечении болезней вен:*

Обычная дозировка:

2 покрытые пленочной оболочкой таблетки в день — 1 таблетка днем и 1 таблетка вечером, во время еды.

*При остром приступе геморроя:*

6 покрытых пленочной оболочкой таблеток в день в течение 4 дней, затем по 4 таблетки в день в течение 3 дней.

## **Метод и способ введения**

Пероральный прием.

## **Продолжительность лечения**

Ваш врач скажет вам, как долго вы должны будете принимать препарат. Не прекращайте лечения без указания врача или не посоветовавшись с фармацевтом.

## **Если вы приняли больше ДЕТРАЛЕКСА, чем вам рекомендовано**

Если вы приняли больше таблеток ДЕТРАЛЕКСА, чем вам назначено, то немедленно обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту.

## **Если вы забыли принять ДЕТРАЛЕКС**

Не удваивайте последующую дозу.

Если у вас возникли дополнительные вопросы по приему препарата, обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту.

## **4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

Как и остальные лекарственные препараты, ДЕТРАЛЕКС, хотя и не у каждого пациента, может вызывать побочные действия.

К ним относятся:

- *Распространенные (менее, чем у 1 пациента из 10, но более, чем у 1 из 100):* диарея, диспепсия, тошнота, рвота.

- *Нераспространенные (менее, чем у 1 пациента из 100, но более, чем у 1 из 1000):* колит.

- *Редкие (менее, чем у 1 пациента из 1000, но более, чем у 1 из 10 000):* головокружение, головная боль, недомогание, сыпь, зуд, крапивница.

- *Частота неизвестна:* изолированный отек лица, губ, век. В исключительных случаях: отек Квинке.

Если побочные эффекты приобретают серьезный характер или если вы отметили нежелательные эффекты, не перечисленные в этом вкладыше, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

## 5. КАК ХРАНИТЬ ДЕТРАЛЕКС

Держать вне досягаемости и вне видимости детей.

Срок хранения: 4 года

Не принимать препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Хранить при температуре не выше 30°C.

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Что содержит ДЕТРАЛЕКС:

500 мг микронизированной очищенной флавоноидной фракции, которая состоит из:

- 450 мг диосмина
- 50 мг флавоноидов, выраженных через гесперидин.

Вспомогательные вещества: желатин, магния стеарат, микрокристаллическая целлюлоза, натрия крахмалгликолят, тальк, глицерол, макрогол 6000, гипромеллоза, железа оксид красный (E172), натрия лаурилсульфат, титана диоксид (E171), железа оксид желтый (E172).

### Как выглядит ДЕТРАЛЕКС и содержимое упаковки:

Овальные таблетки оранжево-розового цвета, покрытые пленочной оболочкой.

- Пачка, содержащая 30 таблеток, покрытых пленочной оболочкой: 2 контурные ячейковые упаковки, каждая из которых содержит 15 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, а также листок-вкладыш с информацией для пациента, вложенные в картонную пачку.

- Пачка, содержащая 60 таблеток, покрытых пленочной оболочкой: 4 контурные ячейковые упаковки, каждая из которых содержит 15 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, а также листок-вкладыш с информацией для пациента, вложенные в картонную пачку.

Не все расфасовки могут иметься в продаже.

### Владелец регистрационного удостоверения и Изготовитель

#### Владелец регистрационного удостоверения

Les Laboratoires Servier

«Ле Лаборатуар Сервье»

50 rue Carnot

92284 Suresnes Cedex France - Франция

**Изготовитель**

Les Laboratoires Servier Industrie  
«Ле Лаборатуар Сервье Индастри»  
45520 Gidy  
France (Франция)

**Дата последнего пересмотра текста**

Июль 2011 г.

---