

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

### Эреспал 80 мг Фенспирида гидрохлорид

**Внимательно прочтите этот вкладыш до конца перед тем, как начать прием препарата.**

- Сохраните этот листок-вкладыш. Он может вам еще понадобиться.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту.
- Этот препарат был выписан для приема лично вам. Не следует передавать его другим лицам. Это может повредить им, даже если их симптомы сходны с вашими.
- Если побочные эффекты приобретают серьезный характер или если вы отметили нежелательные эффекты, которые не перечислены в этом вкладыше, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

**В этом вкладыше содержится следующая информация:**

1. Что такое Эреспал и в каких случаях он применяется
2. Перед тем, как начать прием Эреспала
3. Как принимать Эреспал
4. Возможное побочное действие
5. Как принимать Эреспал
6. Дополнительная информация

#### **1. ЧТО ТАКОЕ ЭРЕСПАЛ И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ**

Симптоматическое лечение респираторных заболеваний (кашель, отхождение мокроты и др.) Лечение фенспиридом не заменяет антибактериальную терапию и не может служить причиной для откладывания адекватного назначения антибактериальных лекарственных средств

Другие препараты для системного применения при синдромах обструкции дыхательных путей

(R: дыхательная система)

#### **2. ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ПРИЕМ ЭРЕСПАЛА**

**В каких случаях не следует принимать Эреспал:**

- Известная повышенная чувствительность к фенспириду или одному из вспомогательных веществ.

*Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.*

## **Будьте особенно осторожны при приеме Эреспала:**

*Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.*

### **Прием других препаратов:**

Всегда сообщайте своему врачу или фармацевту, какие препараты вы принимаете или недавно принимали, даже если это препараты, отпускаемые без рецепта.

При терапии Эреспалом не рекомендуется принимать седативные препараты.

### **Прием Эреспала с едой и питьем:**

При терапии Эреспалом не рекомендуется употреблять алкоголь.

### **Беременность и кормление грудью:**

Советуйтесь с врачом или фармацевтом, перед тем как начинать прием любого медицинского препарата.

Прием данного препарата во время беременности не рекомендуется.

Если беременность обнаруживается во время курса лечения, необходимо прервать его и обратиться к врачу, который назначит вам другой препарат.

Прием данного препарата при грудном вскармливании не рекомендуется.

Общее правило: если вы беременны или кормите грудью, всегда советуйтесь с врачом или фармацевтом перед тем, как начать прием какого-либо медицинского препарата.

### **Вождение автотранспорта и управление механизмами:**

Этот препарат может вызвать сонливость и головокружение, особенно в начале лечения или при приеме алкоголя, что может повлиять на способность вождения автотранспорта и использования механизмов.

Если у вас проявились эти побочные эффекты, не водите автотранспорт и не управляйте машинным оборудованием.

## **3. КАК ПРИНИМАТЬ ЭРЕСПАЛ**

При приеме Эреспала всегда строго соблюдайте указания врача. Если вы сомневаетесь в правильности приема препарата, вы должны посоветоваться с врачом или фармацевтом.

Пероральный прием.

Только для взрослых: по 1 таблетке 2-3 раза в день.

### **Продолжительность лечения:**

Согласно предписанию врача.

### **Если вы приняли больше Эреспала, чем вам рекомендовано:**

Если вы приняли слишком большую дозу Эреспала, немедленно свяжитесь с врачом или фармацевтом.

В случае приема слишком большой дозы препарата, могут быть отмечены следующие признаки передозировки: сонливость или перевозбуждение, тошнота, рвота, синусная тахикардия.

Действия при передозировке должны включать в себя промывание желудка и мониторинг ЭКГ.

**Если вы забыли принять Эреспал:**

Не удваивайте последующую дозу. Просто примите следующую дозу в обычное время.

Если у вас возникли дополнительные вопросы по приему препарата, обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту.

#### **4. ВОЗМОЖНОЕ ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Как и все остальные лекарственные препараты, Эреспал, хотя и не у каждого пациента, может вызывать побочные эффекты.

При оценке побочных эффектов по их частоте выделяются следующие группы симптомов:

Очень распространенные	Наступают более, чем у 1 пациента из 10
Распространенные	Наступают более, чем у 1 из 100 пациентов, но менее, чем у 1 из 10
Нераспространенные	Наступают более, чем у 1 из 1000 пациентов, но менее, чем у 1 из 100
Редкие	Наступают более, чем у 1 из 10000 пациентов, но менее, чем у 1 из 1000
Очень редкие	Наступают менее, чем у 1 пациента из 10000
Частота неизвестна:	Провести оценку на основании имеющихся данных невозможно.

Распространенные побочные эффекты: желудочно-кишечные расстройства, тошнота, боль в желудке.

Редкие побочные эффекты: умеренная тахикардия, которая уменьшается при снижении дозы, сонливость, эритема, сыпь, крапивница, ангиоотек, фиксированная кожная сыпь.

Побочные эффекты, распространенность которых неизвестна: диарея, рвота, астения, усталость, головокружение, зуд.

Если побочные эффекты приобретают серьезный характер или если вы отметили нежелательные эффекты, которые не перечислены в этом вкладыше, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

## 5. КАК ХРАНИТЬ ЭРЕСПАЛ

Держать вне досягаемости и вне видимости детей.

Хранить при температуре не выше 30°C.

Не следует спускать лекарства в сточные воды или в канализацию. Спросите у фармацевта, как избавиться от лекарств, прием которых закончен. Эти меры направлены на защиту окружающей среды.

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Что содержит Эреспал

Фенспирида гидрохлорид .....80 мг на таблетку

Вспомогательные вещества: гидрофосфат кальция, гипромеллоза, повидон, коллоидный безводный диоксид кремния, магния стеарат, двуокись титана (E171), глицерол, макрогол 6000.

### Как выглядит Эреспал и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые оболочкой

Белые, круглые, покрытые оболочкой, двояковыпуклые таблетки

Пачки, содержащие по 30 таблеток.

Пачка, содержащая 30 таблеток в контурной ячейковой упаковке (ПВХ/алюминий)

Картонная пачка содержит 2 контурных ячейковых упаковки, каждая из которых содержит по 15 таблеток, покрытых оболочкой, а также памятку с информацией для пациента.

### Держатель разрешения на маркетинг

Les Laboratoires Servier

Ле Лаборатуар Сервье

22, rue Garnier

92200 Neuilly-sur-Seine

Франция

### Изготовитель

Les Laboratoires Servier Industrie

Ле Лаборатуар Сервье Индустри

905, route de Saran

45520 Gidy - Франция

**Дата последнего пересмотра вкладыша:**